

Dezinficijens. Sredstvo za odstranjivanje kamenca.

Svojstva:

Eliminira patogene organizme. Daje visok stepen higijene. Uklanja kamenac. Eliminira neugodne mirise.

Uputstvo za upotrebu:

PERIVE POVRŠINE I PODOVI. Razrijediti 2-5% proizvoda u vodi. Oprati na uobičajen način. Ostaviti da radi i isprati vodom. Efikasnost dezinficiranja. Proizvod razrijeđen u vodi na 5%. Vrijeme djelovanja: 5 minuta.



Prodajni formati: 5 kg

Fizička i hemiska svojstva:

aspekt:	Providna tečnost
Boja:	Roza
Miris:	bez mirisa
Gustoća:	1,01+-0,01
pH:	pH

Šifra:	800040
Verzija / Datum:	10 / 12/01/2015
Jezik:	BOS

Aplikacije:

Pogodan za:

Perive površine otporne na kiseli pH. Keramika. Kupaoni pribor. Pločice.

Ustanove:

Industrijsko ugostiteljstvo. Zdravstvene ustanove. Hoteli. Sportske instalacije. Bazeni. Prehrambena industrija. U principu, sve vrste objekata koje rade sa profesionalnim standardima higijene.

Doziranje:



Sanitarni centri



Centri. Institucionalni



Prehrambena industrija



1-5 %



1-5 %



1-5 %



1-5 %



1-5 %



1-5 %

Kvalitativni sastav:

Sastav: Didecildimetilamonijum klorid 3%. Glikolna kiselina 7%. Pomoćne supstance i rastvarač qs 100%.



www.sucitesa.com

Akreditacije:



Prijave:

AQUAGEN® DBA



Informacije kao smjernice za potrebe prodaje. Slijedite upute na etiketi i Sigurnosni list prilikom rukovanja i upotrebe proizvoda. Kontaktirajte našu tehničku službu ako imate bilo kakvih pitanja.

Prije upotrebe proizvoda, pažljivo pročitati etiketu. Da bi izbjegli životne opasnosti i opasnosti po okoliš, slijediti upute za korištenje. Tečnost. UNE-EN 13697 standardu - u skladu: pod čistim uvjetima. Kemijski dezinficijensi i antiseptici. Kvantitativni test ne-porozne površine za procjenu bakteriocidne i fungicidne sposobnosti hemijskog dezinficijensa i antiseptika koji se koriste sa prehrambenim proizvodima u industriji, kod kuće i u zajednicama. Trebalo bi se koristiti u prehrambenoj industriji za dezinfekciju kontakta površina i opreme bez prisustva namirnica. Moraju biti poduzete sve potrebe mjere za prehrambene proizvode, mehanizaciju i/ili pribor koji se koristi u prostorijama ili objektima koji su se prethodno bili tretirani gore navedenim proizvodom, tako da nema nikakvih ostataka. Da bi to osigurali, tretirani dijelovi moraju biti isprani na odgovarajući način prije upotrebe. Ne miješati s ostalim hemijskim proizvodima. uputstvo za direktnu dezinfekciju: na površinama koristeći krpu ili mop sa rastvorenim proizvodom u vodi. Prije upotrebe proizvoda, treba uraditi temeljito čišćenje. Proizvod razrijeđen u vodi na 5%. Vrijeme kontakta: 5 minuta. aplikacija isključivo od strane kvalificiranog osoblja. Nekompatibilno sa organskim materijalima, anionskim deterdžentima, derivatima amonijaka, hipohloridima. Nekompatibilno sa kromom, olovom, aluminijem, limom, cinkom i njihovim legurama (bronca, mesing, itd). Praznim kontejnerima treba upravljati prema njihovim karakteristikama prema opasnosti i u skladu sa propisima putem ovaštenih menadžera za otpad. Prije tretiranja treba uraditi test, kako bi se provjerila kompatibilnost proizvoda na materijalima. Trovanje može dovesti do: Od iritacije do korozije na koži, u očima, sluznicama, respiratornog i gastrointestinalnog trakta sa intenzivnim bolom i rizik želučanog perforacije. (Odsustvo vidljivih opekotina usta ne isključuje mogućnost opekotina u jednjaku). Kemijska upala pluća od aspiracije i metabolička acidoza. Prva pomoć: Uklonite osoba iz kontaminiranog područja i ukloniti kontaminiranu odjeću. Ako dođe u kontakt sa očima: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Izvaditi kontaktne leće, ako postoje i lako raditi. Nastaviti ispiranje. Ako dodje u kontakt sa kožom: Pažljivo oprati sa puno vode i sapuna. Ako se proguta: ne izazivati povraćanje. Ne davati ništa u usta. držati pacijenta u mirovanju. Održavati tjelesnu temperaturu. Pratiti disanje. Ako je potrebno, dati umjetno disanje. Ako je unesrećeni bez svijesti, poleći ga na stranu glavom niže odostatka tijela i koljenima blago savijenim.. Odvesti povrijeđenu osobu u medicinski centar sa etiketom ili spremnikom, ako je moguće. NIKADA NE OSTAVLJATI UNESREĆENOG SAMOG. Terapijski savjetl za liječnike i zdravstveno osoblje: Razrjeđivanje s vodom ili mlijekom je prikladno ako nije došlo do povraćanja. (odrasli 120-240 ml, djeca ne bi trebalo da prelazi 120 ml). U slučaju gutanja, procijeniti korištenje endoskopije. Kontraindikacija: sirup od lpecac i neutralizacija. Simptomatska terapija.

Dodatne informacije: